

【SR-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳癌 放射線療法 CQ1寡分割照射
対象	早期乳癌 乳房部分切除後
介入	寡分割照射
対照	通常分割照射

* バイアスリスク、非直接性

各ドメインの評価は「高 (-2)」、「中/疑い (-1)」、「低 (0)」の3段階。
 まとめは「高 (-2)」、「中 (-1)」、「低 (0)」の3段階でエビデンス総体に反映させる。

** 上昇要因


各項目の評価は「高 (+2)」、「中 (+1)」、「低 (0)」の3段階。
 まとめは「高 (+2)」、「中 (+1)」、「低 (0)」の3段階でエビデンス総体に反映させる。
 アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体


アウトカム	研究数 デザイン	* バイアスリスク	* 非一貫性	* 不精確性	* 非直接性	* その他 (出版バイアスなど)	* (観察研究) 上昇要因	リスク人数 (アウトカム率)						効果指標 (種類)	効果指標 統合値	95% 信頼区間	の強さ	* * * エビデンス重要性	コメント
								対照群分母	対照群分子	(%)	介入群分母	介入群分子	(%)						
O1同側乳房内再発 (局所再発) 再発割合の低下	RCT/7	0	0	0	0	0		4294	221	5.1%	5672	298	5.3%	RR	0.94	0.79-1.11	強(A)	9	
O3全生存期割合の低下	RCT/6	0	0	0	0	0		5319	771	14.5%	6041	869	14.4%	HR	0.92	0.82-1.04	強(A)	8	
O4無再発生存割合の低下	RCT/4	0	0	0	0	0		2830	481	17.0%	3485	617	17.7%	HR	0.99	0.80-1.21	中(B)	7	
O5整容性の維持	RCT/8	-1	0	0	-1	0		1854	521	28.1%	2134	638	29.9%	RR	0.94	0.83-1.07	中(B)	7	
O6急性期有害事象の悪化(皮膚炎G2 or worse)	RCT/5	-1	0	0	-1	0		336	176	52.4%	321	91	28.3%	RR	0.55	0.45-0.66	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(晩期肺毒性)	RCT/5	-1	0	0	-1	0		2937	59	2.0%	3680	65	1.8%	RR	0.96	0.68-1.37	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(乳房硬結)	RCT/7	-1	0	0	-1	0		3393	533	15.7%	4307	697	16.2%	RR	0.92	0.83-1.02	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(毛細血管拡張)	RCT/5	-1	0	0	-1	0		2908	202	6.9%	3916	239	6.1%	RR	0.86	0.67-1.12	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(乳房浮腫)	RCT/5	-1	0	0	-1	0		2705	216	8.0%	3627	253	7.0%	RR	0.74	0.51-1.07	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(乳房萎縮)	RCT/5	-1	0	0	-1	0		1998	608	30.4%	2882	830	28.8%	RR	0.90	0.83-0.98	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(乳房痛)	RCT/3	-1	0	0	-1	0		1286	78	6.1%	1290	58	4.5%	RR	0.75	0.54-1.05	中(B)	7	
O7晩期有害事象の悪化(肋骨骨折)	RCT/3	-1	0	-1	-1	0		2466	23	0.9%	3219	41	1.3%	RR	1.43	0.85-2.39	弱(C)	7	
O7晩期有害事象の悪化(虚血性心疾患)	RCT/3	-1	0	-1	-1	0		2217	41	1.8%	2962	42	1.4%	RR	0.78	0.50-1.20	弱(C)	7	

コメント (該当するセルに記入)


O1同側乳房内再発（局所再発）再発割合の低下




O3全生存期割合の低下




O4無再発生存割合の低下




O5整容性の維持




O6急性期有害事象の悪化(皮膚炎G2 or worse)




O7晚期有害事象の悪化(晩期肺毒性)




O7晩期有害事象の悪化(乳房硬結)




O7晩期有害事象の悪化(毛細血管拡張)




O7晩期有害事象の悪化(乳房浮腫)




O7晩期有害事象の悪化(乳房委縮)



O7晩期有害事象の悪化(乳房痛)



O7晩期有害事象の悪化(肋骨骨折)



O7晩期有害事象の悪化(虚血性心疾患)

