【SR-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房全切除術後に腋窩リンパ節転移1～3個の患者では，乳房全切除術後放射線療法（PMRT）が
対象	乳房全切除術後で腋窩リンパ節転移1～3個の患者
介入	PMRTを行う
対照	PMRTを行わない

＊バイアスリスク，非直接性
各ドメインの評価は「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
まとめは「高（−2）」，「中（−1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
＊＊上昇要因
各項目の評価は「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階。
まとめは「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体

アウトカム	研究デザイン／研究数	＊バイアスリスク	＊非一貫性	＊不精確性	＊非直接性	＊その他（出版バイアスなど）	＊上昇要因（観察研究）	リスク人数（アウトカム率） 対照群分母	対照群分子	（%）	介入群分母	介入群分子	（%）	効果指標（種類）	効果指標統合値	95%信頼区間	＊＊エビデンスの強さ	＊＊＊重要性	コメント
局所・領域リンパ節再発	MA/1	0	0	0	−1	0		669	112	20.30%	625	19	3.80%	RR	0.24	0.17-0.34	強(A)	8	
遠隔再発	MA/1	0	0	0	−1	0		669	192	28.60%	625	192	31.30%	RR	1.07	0.91-1.27	強(A)	7	
乳癌死亡	MA/1	0	0	0	−1	0		682	325	50.20%	632	248	42.30%	RR	0.8	0.67-0.95	強(A)	8	
全生存	MA/1	0	0	0	−1	0			NS	56.40%		NS	53.50%	RR	0.89	0.77-1.04	強(A)	9	
晩期有害事象（心臓）	MA/1	0	0	0	−1	0		180250	548		194957	705		RR	1.3	1.15-1.46	中(B)	7	
晩期有害事象（二次発がん）	MA/2	0	0	0	−2	0		180250	761		194957	974		RR	1.23	1.12-1.36	中(B)	7	MA1編(Taylor, 2017)について記載
								NS			NS			RR	1.22	1.06-1.41	中(B)		MA1編(Grantzau, 2015)について記載

コメント（該当するセルに記入）

局所・領域リンパ節再発										10yLRR			10yLRR						
遠隔再発										10yDMR			10yDMR						
乳癌死亡										20yBCM			20yBCM						
全生存										20yAnyDeath			20yAnyDeath						

【SR-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房全切除術後に腋窩リンパ節転移1～3個の患者では，乳房全切除術後放射線療法（PMRT）が勧めら
対象	乳房全切除術後で腋窩リンパ節転移1～3個の患者
介入	PMRTを行う
対照	PMRTを行わない

＊バイアスリスク，非直接性
　各ドメインの評価は「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（−2）」，「中（−1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
＊＊上昇要因
　各項目の評価は「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体

アウトカム	研究デザイン／研究数	＊バイアスリスク	＊非一貫性	＊不精確性	＊非直接性	＊その他（出版バイアスなど）	＊上昇要因（観察研究）	リスク人数（アウトカム率） 対照群分母	対照群分子	（%）	介入群分母	介入群分子	（%）	効果指標（種類）	効果指標統合値	95%信頼区間	＊＊エビデンスの強さ	＊＊＊重要性	コメント
局所・領域リンパ節再発	後向きコホート/19	−2	0	0	0	0	0							HR	0.37	0.27-0.51	弱(C)	8	
遠隔再発	後向きコホート/11	−2	0	0	0	0	0							HR	0.89	0.71-1.11	弱(C)	7	
乳癌死亡	後向きコホート/3	−2	0	0	0	0	0							HR	0.98	0.90-1.06	非常に弱(D)	8	3編のみ
全生存	後向きコホート/13	−2	0	0	0	0	0							HR	0.83	0.70-0.98	弱(C)	9	
晩期有害事象（心臓）	後向きコホート/1	−2	0	0	−2	0	0	3711	203		9088	339		RR	1.25	1.03-1.53	非常に弱(D)	7	Wennsting, 2020
晩期有害事象（二次発がん）	後向きコホート/1	−1	0	0	−1	0	0	8973	286		13655	378		RR	0.87	0.75-1.01	弱(C)	7	Xie, 2018
晩期有害事象（リンパ浮腫）	前向きコホート/1	−1	0	0	−2	0	0	60	11	18.27	169	40	23.93	RR	1.29	0.71-2.35	弱(C)	7	Warren, 2014

コメント（該当するセルに記入）