【SR-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房手術後に腋窩リンパ節転移陽性で，領域リンパ節照射あるいは乳房全切除術後放射線療法
対象	腋窩リンパ節転移陽性で、領域リンパ節照射あるいは乳房全切除術後放射線療法を行う場合
介入	内胸リンパ節領域を照射野に含む
対照	内胸リンパ節領域を照射野に含まない

＊バイアスリスク，非直接性
　各ドメインの評価は「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（−2）」，「中（−1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
＊＊上昇要因
　各項目の評価は「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体

								リスク人数（アウトカム率）											
アウトカム	研究デザイン／研究数	＊バイアスリスク	＊非一貫性	＊不精確性	＊非直接性	＊その他（出版バイアスなど）	＊上昇要因（観察研究）	対照群分母	対照群分子	（%）	介入群分母	介入群分子	（%）	効果指標（種類）	効果指標統合値	95%信頼区間	＊＊エビデンスの強さ	＊＊＊重要性	コメント
局所・領域リンパ節再発の低下	RCT/3	0	-1	0	−2	0		3580	318		3590	268		RR	0.83	0.65-1.06	C	8	
遠隔再発率の低下	RCT/3	0	-1	0	-2	0		3580	936		3590	761		RR	0.84	0.60-1.20	C	7	
乳癌死亡率の低下	RCT/2	0	0	0	-2	0		2002	378		2002	314		HR	0.81	0.71-0.92	C	8	
全生存の改善	RCT/3	0	-1	0	-2	0		3590	378		3590	155		HR	0.95	0.87-1.04	C	9	
晩期有害事象（肺）	RCT/3	0	-1	0	-2	0		3237	48		3171	125		RR	2.15	1.58-2.92	C	7	
晩期有害事象（心臓）	RCT/3	0	-1	0	-1	0		3523	154		3487	188		RR	1.23	1.00-1.51	B	7	

コメント（該当するセルに記入）

【SR-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房手術後に腋窩リンパ節転移陽性で，領域リンパ節照射あるいは乳房全切除術後放射線療法（PMRT）を行う
対象	腋窩リンパ節転移陽性で、領域リンパ節照射あるいは乳房全切除術後放射線療法を行う場合
介入	内胸リンパ節領域を照射野に含む
対照	内胸リンパ節領域を照射野に含まない

＊バイアスリスク，非直接性
　各ドメインの評価は「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（−2）」，「中（−1）」，「低（0）」の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
＊＊上昇要因
　各項目の評価は「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）」の3 段階。
　まとめは「高（+2）」，「中（+1）」，「低（0）の3 段階でエビデンス総体に反映させる。
アウトカムごとに別紙にまとめる。

エビデンス総体

								リスク人数（アウトカム率）												
アウトカム	研究デザイン／研究数	＊バイアスリスク	＊非一貫性	＊不精確性	＊非直接性	＊その他（出版バイアスなど）	＊上昇要因（観察研究）	対照群分母	対照群分子	（%）	介入群分母	介入群分子	（%）	効果指標（種類）	効果指標統合値	95%信頼区間	＊＊エビデンスの強さ	＊＊＊重要性	コメント
局所・領域リンパ節再発の低下	コホート /6	-2	0	0	0	0	0	2973	194		2633	194		RR	0.74	0.48-1.14	C	8	
遠隔再発率の低下	コホート /6	-2	0	0	0	0	0	2973	928		2633	739		RR	0.91	0.81-1.02	C	7	
乳癌死亡率の低下	コホート /3	-2	0	0	0	0	0							HR	0.87	0.77-0.98	C	8	
全生存の改善	コホート /8	-2	0	0	0	0	0							HR	0.83	0.76-0.91	C	9	
晩期有害事象（肺）	コホート / 2	-2	0	0	0	0	0	543	143		648	134		RR	1.37	0.54-3.42	D	7	
晩期有害事象（心臓）	コホート / 2	-2	0	0	-2	0	0	1763	12		1645	13		RR	1.16	0.53-2.55	D	7	

コメント（該当するセルに記入）