【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	Stage Ⅰ・Ⅱ乳癌術前に対する全身検索の意義
対象	Stage Ⅰ・Ⅱ乳癌の術前
介入	CT,PET,PETCTなどの全身検索を施行する
対照	全身検索を施行しない(局所病期診断のみ)

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイ**	**上昇要因(観察研**	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
遠隔転移の検出	コホート研究7件	-1	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	中(B)	8	コホート研究7件のうち1件は術前と術後が分けられていないため、研究対象集団が異なるが、他の研究においては術前に限定した解析が行われていることから、影響は少ないと判断。また、Stage Ⅰ・Ⅱだけでなく、StageⅢを含む研究が多かったが、いずれの研究もStage毎に分けた結果が示されており問題なし。
ステージ変更	コホート研究6件、システマティックレビュー/メタアナリシス1件	-1	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	中(B)	8	コホート研究6件のうち1件は術前と術後が分けられていないため、研究対象集団が異なるが、他の研究においては術前に限定した解析が行われていることから、影響は少ないと判断。
死亡率減少	対象研究なし	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9	
合併症・副作用	対象研究なし	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	