【SR-8　評価シート　エビデンス総体（絶対効果指標の結果を記入する場合）】

| | |
|---|---|
| 診療ガイドライン | 周術期トリプルネガティブ乳癌に対して、プラチナ製剤は推奨されるか？ |
| 対象 | 早期トリプルネガティブ乳癌 |
| 介入 | プラチナ系化学療法薬を含むレジメン |
| 対照 | その他化学療法薬レジメン |

エビデンスの強さについて，RCT は「強（A）」からスタート，観察研究は「弱（C）」からスタート。
＊各ドメインは「高（−2）」，「中／疑い（−1）」，「低（0）」の3 段階。
＊＊エビデンスの強さは「強（A）」，「中（B）」，「弱（C）」，「非常に弱（D）」の4 段階。
＊＊＊重要性はアウトカムの重要性（1 〜 9）。

エビデンス総体

| | | | | | | | | リスク人数（アウトカム率） | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトカム | 研究デザイン／研究数 | ＊バイアスリスク | ＊非一貫性 | ＊不精確性 | ＊非直接性 | ＊その他（出版バイアスなど） | ＊上昇要因（観察研究） | 対照群分母 | 対照群分子 | （%） | 介入群分母 | 介入群分子 | （%） | 効果指標（種類） | 効果指標統合値 | 95％信頼区間 | ＊＊エビデンスの強さ | ＊＊＊重要性 | コメント | 絶対効果 | 効果指標統合値 | 95％信頼区間 |
| OS | RCT/4 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | | 590 | 78 | | 590 | 42 | | HR | 0.44 | 0.22 - 0.87 | B | 9 | | | | |
| DFS | RCT/5 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | | 744 | 177 | | 744 | 102 | | HR | 0.58 | 0.37 - 0.89 | B | 8 | | | | |
| pCR | RCT/9 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | | 1070 | 385 | | 1060 | 532 | | OR | 1.82 | 1.32 - 2.52 | B | 8 | | | | |
| Neutropenia | RCT/12 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1993 | 1012 | | 1980 | 937 | | RR | 1.28 | 0.83 - 1.98 | B | 6 | | | | |
| Febrile neutropenia | RCT/9 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1772 | 125 | | 1709 | 68 | | RR | 0.67 | 0.29 - 1.57 | B | 6 | | | | |
| Anemia | RCT/9 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1795 | 44 | | 1773 | 141 | | RR | 7.07 | 1.08 - 46.34 | B | 6 | | | | |
| Thrombocytopenia | RCT/10 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1890 | 61 | | 1873 | 123 | | RR | 3.14 | 1.01 - 9.72 | B | 6 | | | | |
| Nausea | RCT/10 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1795 | 40 | | 1779 | 49 | | RR | 1.16 | 0.56 - 2.42 | B | 6 | | | | |
| Peripheral neuropathy | RCT/10 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | | 1890 | 68 | | 1873 | 73 | | RR | 1.3 | 0.73-2.32 | B | 6 | | | | |

コメント（該当するセルに記入）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |