【4-7　評価シート　エビデンス総体】

| | |
|---|---|
| **診療ガイドライン** | 外科療法 |
| **対象** | 乳房温存術　浸潤癌に対する |
| **介入** | 断端陽性（露出） |
| **対照** | 断端陰性（非露出） |

エビデンスの強さはRCTは"強（A）"からスタート、観察研究は弱（C）からスタート
* 各ドメインは"高（-2）"、"中/疑い（-1）"、"低（0）"の3段階
** エビデンスの強さは"強（A）"、"中（B）"、"弱（C）"、"非常に弱（D）"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性（1～9）

**エビデンス総体**

| | | | | | | | | リスク人数（アウトカム率） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **アウトカム** | **研究デザイン/研究数** | **バイアスリスク*** | **非一貫性*** | **不精確*** | **非直接性*** | **その他(出版バイアスなど)*** | **上昇要因(観察研究)*** | **対照群分母** | **対照群分子** | **(%)** | **介入群分母** | **介入群分子** | **(%)** | **効果指標(種類)** | **効果指標統合値** | **信頼区間** | **エビデンスの強さ**** | **重要性***** | **コメント** |
| 乳癌死の減少 | 7 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 非常に弱(D) | 8 | 局所再発率の上昇を比較している論文はあるが、乳がん死の減少を検討している論文は3つ |
| 局所再発率の減少 | 33 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | +2 | 6178 | 501 | 8.1 | 21984 | 1005 | 4.6 | OR | 1.96 | 95%CI: 1.72-2.24 | 中(B) | 8 | 断端陰性に対して陽性と判定されたときに、温存乳房内の局所再発率は1.96倍発生する |
| 整容性低下 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 論文なし |
| コスト | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 論文なし |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**コメント（該当するセルに記入）**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Outocome異なる | | 数が多い | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |