【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	外科療法　C5a 術前化学療法前後で臨床的リンパ節転移陰性症例に対してセンチネルリンパ節生検による腋窩リンパ節郭清の省略は推奨されるか？
対象	原発性浸潤性乳癌　かつ　化学療法施行前後臨床的腋窩リンパ節転移陰性症例
介入	センチネルリンパ節陰性腋窩温存、センチネルリンパ節陽性腋窩郭清
対照	なし

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)												
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
Q1 全生存率の低下	症例集積/1	-2	-2	-2	-1			NA	NA	NA	249	225	90.4%	NA	NA	NA	非常に弱(D)	9	
Q2 無病生存率の低下	症例集積/1	-2	-2	-2	-1			NA	NA	NA	249	188	75.5%	NA	NA	NA	非常に弱(D)	7	
Q3 腋窩再発率の上昇	症例集積/1	-2	-2	-2	-1			NA	NA	NA	249	1	0.4%	NA	NA	NA	非常に弱(D)	9	
Q6 患側上腕に対する合併症・後遺症の軽減	症例集積/1	-2	-2	-2	-1			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	非常に弱(D)	6	アウトカムにない

コメント(該当するセルに記入)

O1 害	単一施設																		
O2 害	単一施設																		
O3 害	単一施設																		
O6 益	単一施設																		