

【4-7 評価シート エビデンス総体】

| | |
|----------|---------------------------|
| 診療ガイドライン | 鎖骨上リンパ節再発に対する外科切除は認められるか？ |
| 対象 | 鎖骨上リンパ節に転移を認め、遠隔転移を認めない症例 |
| 介入 | 鎖骨上リンパ節郭清術 |
| 対照 | 非切除 |

エビデンスの強さはRCTは“強(A)”からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
 * 各ドメインは“高(-2)”、“中/疑い(-1)”、“低(0)”の3段階
 ** エビデンスの強さは“強(A)”、“中(B)”、“弱(C)”、“非常に弱(D)”の4段階
 *** 重要性はアウトカムの重要性(1~9)

| アウトカム | 研究デザイン/研究数 | バイアスリスク* | 非一貫性* | 不精確* | 非直接性* | その他(出版バイアスなど)* | 上昇要因(観察研究)* | リスク人数(アウトカム率) | | | | | | 効果指標(種類) | 効果指標統合値 | 信頼区間 | エビデンスの強さ** | 重要性*** | コメント |
|--------|------------|----------|-------|------|-------|----------------|-------------|---------------|-------|------|------|-------|------|----------|---------|-----------|------------|--------|------|
| | | | | | | | | 対照群母 | 対照群分子 | (%) | 介入群母 | 介入群分子 | (%) | | | | | | |
| 生存率 | 症例集積/2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | | 151 | 95 | 62.9 | 175 | 127 | 72.6 | RR | 0.86 | 0.71-1.05 | 非常に弱(D) | 9 | |
| 無病再発率 | 症例集積/2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 非常に弱(D) | 7 | |
| リンパ節再発 | 症例集積/2 | -2 | -2 | -2 | -2 | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 非常に弱(D) | 7 | |
| 術後合併症 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コスト | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QOL | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント(該当するセルに記入)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 介入群の症例数が少ない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

