

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																																	
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																																
C	通常分割(全乳房)	O	①所属リンパ節再発																																																																																
研究デザイン	RCT	文献数	4	コード	FAST 2001 Hou 2015 Saha 2009 Whelan 2002b																																																																														
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																																
効果指標	リスク比	統合値	1.24 (0.56 - 2.77) P= 0.60																																																																																
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAST 2011</td> <td>1</td> <td>301</td> <td>2</td> <td>607</td> <td>12.6%</td> <td>1.01</td> <td>[0.09, 11.08]</td> </tr> <tr> <td>Hou 2015</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>40</td> <td></td> <td>Not estimable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saha 2009</td> <td>4</td> <td>69</td> <td>3</td> <td>62</td> <td>30.0%</td> <td>1.20</td> <td>[0.28, 5.14]</td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>8</td> <td>622</td> <td>6</td> <td>612</td> <td>57.4%</td> <td>1.31</td> <td>[0.46, 3.76]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>1032</td> <td></td> <td>1321</td> <td>100.0%</td> <td>1.24</td> <td>[0.56, 2.77]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>13</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 0.52 (P = 0.60)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	FAST 2011	1	301	2	607	12.6%	1.01	[0.09, 11.08]	Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable		Saha 2009	4	69	3	62	30.0%	1.20	[0.28, 5.14]	Whelan 2002b	8	622	6	612	57.4%	1.31	[0.46, 3.76]	Total (95% CI)		1032		1321	100.0%	1.24	[0.56, 2.77]	Total events	13		11					Heterogeneity: Chi ² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 0.52 (P = 0.60)							
	Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																											
Events		Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																																													
FAST 2011	1	301	2	607	12.6%	1.01	[0.09, 11.08]																																																																												
Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable																																																																													
Saha 2009	4	69	3	62	30.0%	1.20	[0.28, 5.14]																																																																												
Whelan 2002b	8	622	6	612	57.4%	1.31	[0.46, 3.76]																																																																												
Total (95% CI)		1032		1321	100.0%	1.24	[0.56, 2.77]																																																																												
Total events	13		11																																																																																
Heterogeneity: Chi ² = 0.04, df = 2 (P = 0.98); I ² = 0%																																																																																			
Test for overall effect: Z = 0.52 (P = 0.60)																																																																																			
コメント:																																																																																			
Funnel plot																																																																																			
	コメント:																																																																																		
その他の解析					コメント:																																																																														
メタリグレーション																																																																																			
感度分析																																																																																			

【4-9 メタアナリシス】

CQ	全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																																																																																																																				
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																																																																																																																		
C	通常分割(全乳房)	O	②局所再発																																																																																																																																																																		
研究デザイン	RCT	文献数	4	コード Owen 2006a START_A 2008 START_B 2008 Whelan 2002b																																																																																																																																																																	
モデル	固定効果		方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																																																																																																																	
効果指標	リスク比		統合値	0.94 (0.78 - 1.14) P= 0.55																																																																																																																																																																	
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Study or Subgroup</th> <th>Hypofractionation Events</th> <th>Total</th> <th>Conventional Events</th> <th>Total</th> <th>Weight</th> <th>Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1.2.1 FU 3 years</td> </tr> <tr> <td>FAST 2011</td> <td>0</td> <td>607</td> <td>2</td> <td>301</td> <td>1.6%</td> <td>0.10 [0.00, 2.06]</td> </tr> <tr> <td>Hou 2015</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>40</td> <td></td> <td>Not estimable</td> </tr> <tr> <td>Saha 2009</td> <td>1</td> <td>24</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>1.0%</td> <td>0.48 [0.05, 4.93]</td> </tr> <tr> <td>Subtotal (95% CI)</td> <td></td> <td>671</td> <td></td> <td>364</td> <td>2.5%</td> <td>0.24 [0.04, 1.37]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Chi² = 0.66, df = 1 (P = 0.42), I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 1.60 (P = 0.11)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.2.2 FU 10 years</td> </tr> <tr> <td>Owen 2006a</td> <td>99</td> <td>940</td> <td>48</td> <td>470</td> <td>29.9%</td> <td>1.03 [0.74, 1.43]</td> </tr> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>84</td> <td>1487</td> <td>40</td> <td>749</td> <td>24.9%</td> <td>1.06 [0.73, 1.53]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>36</td> <td>1110</td> <td>50</td> <td>1105</td> <td>23.4%</td> <td>0.72 [0.47, 1.09]</td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>39</td> <td>622</td> <td>41</td> <td>612</td> <td>19.3%</td> <td>0.94 [0.61, 1.43]</td> </tr> <tr> <td>Subtotal (95% CI)</td> <td></td> <td>4159</td> <td></td> <td>2936</td> <td>97.5%</td> <td>0.94 [0.78, 1.14]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>258</td> <td></td> <td>179</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Chi² = 2.30, df = 3 (P = 0.51), I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 0.60 (P = 0.55)</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>4830</td> <td></td> <td>3300</td> <td>100.0%</td> <td>0.93 [0.77, 1.12]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>259</td> <td></td> <td>183</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Chi² = 4.74, df = 5 (P = 0.45), I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 0.81 (P = 0.42)</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for subgroup differences: Chi² = 2.33, df = 1 (P = 0.13), I² = 67.1%</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total	Conventional Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI	1.2.1 FU 3 years							FAST 2011	0	607	2	301	1.6%	0.10 [0.00, 2.06]	Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable	Saha 2009	1	24	2	23	1.0%	0.48 [0.05, 4.93]	Subtotal (95% CI)		671		364	2.5%	0.24 [0.04, 1.37]	Total events	1		4				Heterogeneity: Chi ² = 0.66, df = 1 (P = 0.42), I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 1.60 (P = 0.11)							1.2.2 FU 10 years							Owen 2006a	99	940	48	470	29.9%	1.03 [0.74, 1.43]	START_A 2008	84	1487	40	749	24.9%	1.06 [0.73, 1.53]	START_B 2008	36	1110	50	1105	23.4%	0.72 [0.47, 1.09]	Whelan 2002b	39	622	41	612	19.3%	0.94 [0.61, 1.43]	Subtotal (95% CI)		4159		2936	97.5%	0.94 [0.78, 1.14]	Total events	258		179				Heterogeneity: Chi ² = 2.30, df = 3 (P = 0.51), I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 0.60 (P = 0.55)							Total (95% CI)		4830		3300	100.0%	0.93 [0.77, 1.12]	Total events	259		183				Heterogeneity: Chi ² = 4.74, df = 5 (P = 0.45), I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 0.81 (P = 0.42)							Test for subgroup differences: Chi ² = 2.33, df = 1 (P = 0.13), I ² = 67.1%						
Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total	Conventional Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI																																																																																																																																																															
1.2.1 FU 3 years																																																																																																																																																																					
FAST 2011	0	607	2	301	1.6%	0.10 [0.00, 2.06]																																																																																																																																																															
Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable																																																																																																																																																															
Saha 2009	1	24	2	23	1.0%	0.48 [0.05, 4.93]																																																																																																																																																															
Subtotal (95% CI)		671		364	2.5%	0.24 [0.04, 1.37]																																																																																																																																																															
Total events	1		4																																																																																																																																																																		
Heterogeneity: Chi ² = 0.66, df = 1 (P = 0.42), I ² = 0%																																																																																																																																																																					
Test for overall effect: Z = 1.60 (P = 0.11)																																																																																																																																																																					
1.2.2 FU 10 years																																																																																																																																																																					
Owen 2006a	99	940	48	470	29.9%	1.03 [0.74, 1.43]																																																																																																																																																															
START_A 2008	84	1487	40	749	24.9%	1.06 [0.73, 1.53]																																																																																																																																																															
START_B 2008	36	1110	50	1105	23.4%	0.72 [0.47, 1.09]																																																																																																																																																															
Whelan 2002b	39	622	41	612	19.3%	0.94 [0.61, 1.43]																																																																																																																																																															
Subtotal (95% CI)		4159		2936	97.5%	0.94 [0.78, 1.14]																																																																																																																																																															
Total events	258		179																																																																																																																																																																		
Heterogeneity: Chi ² = 2.30, df = 3 (P = 0.51), I ² = 0%																																																																																																																																																																					
Test for overall effect: Z = 0.60 (P = 0.55)																																																																																																																																																																					
Total (95% CI)		4830		3300	100.0%	0.93 [0.77, 1.12]																																																																																																																																																															
Total events	259		183																																																																																																																																																																		
Heterogeneity: Chi ² = 4.74, df = 5 (P = 0.45), I ² = 0%																																																																																																																																																																					
Test for overall effect: Z = 0.81 (P = 0.42)																																																																																																																																																																					
Test for subgroup differences: Chi ² = 2.33, df = 1 (P = 0.13), I ² = 67.1%																																																																																																																																																																					
	コメント: 3年経過観察と10年経過観察が、今回は10年経過観察を採用																																																																																																																																																																				
Funnel plot																																																																																																																																																																					
	コメント:																																																																																																																																																																				
その他の解析 メタリグレッション 感度分析				コメント:																																																																																																																																																																	

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																																									
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																																								
C	通常分割(全乳房)	O	③遠隔再発																																																																																								
研究デザイン	RCT	文献数	5	コード	FAST 2001 Hou 2015 START_A 2008 START_B 2008 Whelan 2002b																																																																																						
モデル	ランダム効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																																								
効果指標	リスク比	統合値	1.10 (0.72 - 1.68) P= 0.65																																																																																								
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Random, 95% CI</th> <th>M-H, Random, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAST 2011</td> <td>12</td> <td>607</td> <td>5</td> <td>301</td> <td>11.4%</td> <td>1.19</td> <td>[0.42, 3.35]</td> </tr> <tr> <td>Hou 2015</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>40</td> <td></td> <td>Not estimable</td> <td></td> </tr> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>162</td> <td>1487</td> <td>73</td> <td>749</td> <td>31.7%</td> <td>1.12</td> <td>[0.86, 1.45]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>87</td> <td>1110</td> <td>122</td> <td>1105</td> <td>31.7%</td> <td>0.71</td> <td>[0.55, 0.92]</td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>48</td> <td>622</td> <td>26</td> <td>612</td> <td>25.1%</td> <td>1.82</td> <td>[1.14, 2.89]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>3866</td> <td></td> <td>2807</td> <td>100.0%</td> <td>1.10</td> <td>[0.72, 1.68]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td colspan="2">309</td> <td colspan="2">226</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Tau² = 0.13; Chi² = 13.71, df = 3 (P = 0.003); I² = 78%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 0.45 (P = 0.65)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Random, 95% CI	M-H, Random, 95% CI	FAST 2011	12	607	5	301	11.4%	1.19	[0.42, 3.35]	Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable		START_A 2008	162	1487	73	749	31.7%	1.12	[0.86, 1.45]	START_B 2008	87	1110	122	1105	31.7%	0.71	[0.55, 0.92]	Whelan 2002b	48	622	26	612	25.1%	1.82	[1.14, 2.89]	Total (95% CI)		3866		2807	100.0%	1.10	[0.72, 1.68]	Total events	309		226					Heterogeneity: Tau ² = 0.13; Chi ² = 13.71, df = 3 (P = 0.003); I ² = 78%								Test for overall effect: Z = 0.45 (P = 0.65)								
Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																																				
	Events	Total	Events	Total	M-H, Random, 95% CI		M-H, Random, 95% CI																																																																																				
FAST 2011	12	607	5	301	11.4%	1.19	[0.42, 3.35]																																																																																				
Hou 2015	0	40	0	40		Not estimable																																																																																					
START_A 2008	162	1487	73	749	31.7%	1.12	[0.86, 1.45]																																																																																				
START_B 2008	87	1110	122	1105	31.7%	0.71	[0.55, 0.92]																																																																																				
Whelan 2002b	48	622	26	612	25.1%	1.82	[1.14, 2.89]																																																																																				
Total (95% CI)		3866		2807	100.0%	1.10	[0.72, 1.68]																																																																																				
Total events	309		226																																																																																								
Heterogeneity: Tau ² = 0.13; Chi ² = 13.71, df = 3 (P = 0.003); I ² = 78%																																																																																											
Test for overall effect: Z = 0.45 (P = 0.65)																																																																																											
Funnel plot																																																																																											
その他の解析				コメント:																																																																																							
メタリグレッション																																																																																											
感度分析																																																																																											

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																									
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																								
C	通常分割(全乳房)	O	④全生存率																																																																								
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	START_A 2008 START_B 2008 Whelan 2002b																																																																						
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																								
効果指標	リスク比	統合値	0.92 (0.82 - 1.04) P= 0.18																																																																								
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>262</td> <td>1487</td> <td>130</td> <td>749</td> <td>35.1%</td> <td>1.02 [0.84, 1.23]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>159</td> <td>1110</td> <td>192</td> <td>1105</td> <td>39.1%</td> <td>0.82 [0.68, 1.00]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>122</td> <td>622</td> <td>126</td> <td>612</td> <td>25.8%</td> <td>0.95 [0.76, 1.19]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>3219</td> <td></td> <td>2466</td> <td>100.0%</td> <td>0.92 [0.82, 1.04]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>543</td> <td></td> <td>448</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 2.35, df = 2 (P = 0.31); I² = 15%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 1.33 (P = 0.18)</td> </tr> </tbody> </table>				Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	START_A 2008	262	1487	130	749	35.1%	1.02 [0.84, 1.23]		START_B 2008	159	1110	192	1105	39.1%	0.82 [0.68, 1.00]		Whelan 2002b	122	622	126	612	25.8%	0.95 [0.76, 1.19]		Total (95% CI)		3219		2466	100.0%	0.92 [0.82, 1.04]		Total events	543		448					Heterogeneity: Chi ² = 2.35, df = 2 (P = 0.31); I ² = 15%								Test for overall effect: Z = 1.33 (P = 0.18)								コメント:
Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																				
	Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI		M-H, Fixed, 95% CI																																																																				
START_A 2008	262	1487	130	749	35.1%	1.02 [0.84, 1.23]																																																																					
START_B 2008	159	1110	192	1105	39.1%	0.82 [0.68, 1.00]																																																																					
Whelan 2002b	122	622	126	612	25.8%	0.95 [0.76, 1.19]																																																																					
Total (95% CI)		3219		2466	100.0%	0.92 [0.82, 1.04]																																																																					
Total events	543		448																																																																								
Heterogeneity: Chi ² = 2.35, df = 2 (P = 0.31); I ² = 15%																																																																											
Test for overall effect: Z = 1.33 (P = 0.18)																																																																											
Funnel plot					コメント:																																																																						
その他の解析					コメント:																																																																						
メタリグレッション																																																																											
感度分析																																																																											

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																																									
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																																								
C	通常分割(全乳房)	O	⑤整容性																																																																																								
研究デザイン	RCT	文献数	5	コード	Owen 2006a Saha 2009 Taher 2004 Whelan 2002b																																																																																						
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																																								
効果指標	リスク比	統合値	1.11 (0.99 - 1.24) P= 0.07																																																																																								
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hou 2015</td> <td>13</td> <td>40</td> <td>11</td> <td>40</td> <td>3.5%</td> <td>1.18 [0.60, 2.32]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Owen 2006a</td> <td>165</td> <td>271</td> <td>291</td> <td>535</td> <td>61.6%</td> <td>1.12 [0.99, 1.27]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saha 2009</td> <td>3</td> <td>23</td> <td>6</td> <td>24</td> <td>1.8%</td> <td>0.52 [0.15, 1.84]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taher 2004</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>1.9%</td> <td>1.83 [0.92, 3.66]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>105</td> <td>604</td> <td>100</td> <td>616</td> <td>31.2%</td> <td>1.07 [0.83, 1.37]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>953</td> <td></td> <td>1230</td> <td>100.0%</td> <td>1.11 [0.99, 1.24]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>297</td> <td></td> <td>414</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 3.54, df = 4 (P = 0.47); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 1.79 (P = 0.07)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	Hou 2015	13	40	11	40	3.5%	1.18 [0.60, 2.32]		Owen 2006a	165	271	291	535	61.6%	1.12 [0.99, 1.27]		Saha 2009	3	23	6	24	1.8%	0.52 [0.15, 1.84]		Taher 2004	11	15	6	15	1.9%	1.83 [0.92, 3.66]		Whelan 2002b	105	604	100	616	31.2%	1.07 [0.83, 1.37]		Total (95% CI)		953		1230	100.0%	1.11 [0.99, 1.24]		Total events	297		414					Heterogeneity: Chi ² = 3.54, df = 4 (P = 0.47); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 1.79 (P = 0.07)							
Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight		Risk Ratio																																																																																				
	Events	Total	Events	Total		M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																																																				
Hou 2015	13	40	11	40	3.5%	1.18 [0.60, 2.32]																																																																																					
Owen 2006a	165	271	291	535	61.6%	1.12 [0.99, 1.27]																																																																																					
Saha 2009	3	23	6	24	1.8%	0.52 [0.15, 1.84]																																																																																					
Taher 2004	11	15	6	15	1.9%	1.83 [0.92, 3.66]																																																																																					
Whelan 2002b	105	604	100	616	31.2%	1.07 [0.83, 1.37]																																																																																					
Total (95% CI)		953		1230	100.0%	1.11 [0.99, 1.24]																																																																																					
Total events	297		414																																																																																								
Heterogeneity: Chi ² = 3.54, df = 4 (P = 0.47); I ² = 0%																																																																																											
Test for overall effect: Z = 1.79 (P = 0.07)																																																																																											
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																																																										
その他の解析					コメント:																																																																																						
メタリグレッション																																																																																											
感度分析																																																																																											

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																									
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																								
C	通常分割(全乳房)	O	⑥急性期皮膚炎 G≥2																																																																								
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	FAST 2011 Shaitelman 2015 Taher 2004																																																																						
モデル	ランダム効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																								
効果指標	リスク比	統合値	0.44 (0.26 - 0.75) P= 0.003																																																																								
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Random, 95% CI</th> <th>M-H, Random, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAST 2011</td> <td>27</td> <td>613</td> <td>51</td> <td>302</td> <td>34.5%</td> <td>0.26</td> <td>[0.17, 0.41]</td> </tr> <tr> <td>Shaitelman 2015</td> <td>50</td> <td>138</td> <td>103</td> <td>149</td> <td>41.3%</td> <td>0.52</td> <td>[0.41, 0.67]</td> </tr> <tr> <td>Taher 2004</td> <td>6</td> <td>15</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>24.2%</td> <td>0.67</td> <td>[0.32, 1.40]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>766</td> <td></td> <td>466</td> <td>100.0%</td> <td>0.44</td> <td>[0.26, 0.75]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>83</td> <td></td> <td>163</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Tau² = 0.17; Chi² = 8.67, df = 2 (P = 0.01); I² = 77%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 3.02 (P = 0.003)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Random, 95% CI	M-H, Random, 95% CI	FAST 2011	27	613	51	302	34.5%	0.26	[0.17, 0.41]	Shaitelman 2015	50	138	103	149	41.3%	0.52	[0.41, 0.67]	Taher 2004	6	15	9	15	24.2%	0.67	[0.32, 1.40]	Total (95% CI)		766		466	100.0%	0.44	[0.26, 0.75]	Total events	83		163					Heterogeneity: Tau ² = 0.17; Chi ² = 8.67, df = 2 (P = 0.01); I ² = 77%								Test for overall effect: Z = 3.02 (P = 0.003)							
	Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																			
Events		Total	Events	Total	M-H, Random, 95% CI	M-H, Random, 95% CI																																																																					
FAST 2011	27	613	51	302	34.5%	0.26	[0.17, 0.41]																																																																				
Shaitelman 2015	50	138	103	149	41.3%	0.52	[0.41, 0.67]																																																																				
Taher 2004	6	15	9	15	24.2%	0.67	[0.32, 1.40]																																																																				
Total (95% CI)		766		466	100.0%	0.44	[0.26, 0.75]																																																																				
Total events	83		163																																																																								
Heterogeneity: Tau ² = 0.17; Chi ² = 8.67, df = 2 (P = 0.01); I ² = 77%																																																																											
Test for overall effect: Z = 3.02 (P = 0.003)																																																																											
<p>コメント: 異質性の検討からランダム効果モデルとした</p>																																																																											
Funnel plot																																																																											
	<p>コメント:</p>																																																																										
その他の解析					コメント:																																																																						
メタリグレッション																																																																											
感度分析																																																																											

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																															
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(放射線肺臓炎)																																																															
研究デザイン	RCT	文献数	2	コード	Shaitelman 2015 Whelan 2002b																																																													
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																															
効果指標	リスク比	統合値	0.98 (0.14 - 6.96) P= 0.99																																																															
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shaitelman 2015</td> <td>0</td> <td>129</td> <td>0</td> <td>142</td> <td rowspan="2">100.0%</td> <td colspan="2">Not estimable</td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>2</td> <td>622</td> <td>2</td> <td>612</td> <td colspan="2">0.98 [0.14, 6.96]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>751</td> <td></td> <td>754</td> <td>100.0%</td> <td colspan="2">0.98 [0.14, 6.96]</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Total events: 2 (Hypofractionation), 2 (Conventional)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Not applicable</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 0.02 (P = 0.99)</td> </tr> </tbody> </table> <p>コメント:</p>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	Shaitelman 2015	0	129	0	142	100.0%	Not estimable		Whelan 2002b	2	622	2	612	0.98 [0.14, 6.96]		Total (95% CI)		751		754	100.0%	0.98 [0.14, 6.96]		Total events: 2 (Hypofractionation), 2 (Conventional)								Heterogeneity: Not applicable								Test for overall effect: Z = 0.02 (P = 0.99)							
Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight		Risk Ratio																																																											
	Events	Total	Events	Total		M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																											
Shaitelman 2015	0	129	0	142	100.0%	Not estimable																																																												
Whelan 2002b	2	622	2	612		0.98 [0.14, 6.96]																																																												
Total (95% CI)		751		754	100.0%	0.98 [0.14, 6.96]																																																												
Total events: 2 (Hypofractionation), 2 (Conventional)																																																																		
Heterogeneity: Not applicable																																																																		
Test for overall effect: Z = 0.02 (P = 0.99)																																																																		
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																																	
その他の解析					コメント:																																																													
メタリグレッション																																																																		
感度分析																																																																		

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																																																																																			
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																																																																																		
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(乳房線維化)																																																																																																																																		
研究デザイン	RCT	文献数	4	コード	Owen 2006a START_A 2008 START_B 2008 Whelan 2002b																																																																																																																																
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																																																																																		
効果指標	リスク比	統合値	0.93 (0.83 - 1.05) P= 0.24																																																																																																																																		
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Study or Subgroup</th> <th>Hypofractionation Events</th> <th>Total Events</th> <th>Conventional Events</th> <th>Total Events</th> <th>Total Weight</th> <th>Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI</th> <th>Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">1.1 5 years</td> </tr> <tr> <td>Owen 2006a</td> <td>163</td> <td>535</td> <td>77</td> <td>271</td> <td>21.9%</td> <td>1.07 [0.85, 1.35]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal (95% CI)</td> <td></td> <td>535</td> <td></td> <td>271</td> <td>21.9%</td> <td>1.07 [0.85, 1.35]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>163</td> <td></td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Not applicable Test for overall effect: Z = 0.80 (P = 0.55)</td> </tr> <tr> <td colspan="8">1.2 10 years</td> </tr> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>260</td> <td>1244</td> <td>142</td> <td>616</td> <td>40.5%</td> <td>0.91 [0.76, 1.09]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>129</td> <td>1008</td> <td>153</td> <td>1003</td> <td>32.7%</td> <td>0.84 [0.66, 1.04]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>28</td> <td>235</td> <td>33</td> <td>220</td> <td>5.1%</td> <td>1.14 [0.66, 1.93]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal (95% CI)</td> <td></td> <td>2485</td> <td></td> <td>1839</td> <td>78.2%</td> <td>0.89 [0.78, 1.02]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>417</td> <td></td> <td>318</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: ChiP = 1.17, df = 2 (P = 0.56), I² = 0% Test for overall effect: Z = 1.63 (P = 0.10)</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>3020</td> <td></td> <td>2110</td> <td>100.0%</td> <td>0.93 [0.83, 1.05]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>580</td> <td></td> <td>395</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: ChiP = 2.89, df = 3 (P = 0.40), I² = 0% Test for overall effect: Z = 1.17 (P = 0.24) Test for subgroup differences: ChiP = 1.81, df = 1 (P = 0.18), I² = 44.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>コメント: 5年経過(Owen 2006a)も10年経過もともに含めた。</p>					Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total Events	Conventional Events	Total Events	Total Weight	Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI	Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI	1.1 5 years								Owen 2006a	163	535	77	271	21.9%	1.07 [0.85, 1.35]		Subtotal (95% CI)		535		271	21.9%	1.07 [0.85, 1.35]		Total events	163		77					Heterogeneity: Not applicable Test for overall effect: Z = 0.80 (P = 0.55)								1.2 10 years								START_A 2008	260	1244	142	616	40.5%	0.91 [0.76, 1.09]		START_B 2008	129	1008	153	1003	32.7%	0.84 [0.66, 1.04]		Whelan 2002b	28	235	33	220	5.1%	1.14 [0.66, 1.93]		Subtotal (95% CI)		2485		1839	78.2%	0.89 [0.78, 1.02]		Total events	417		318					Heterogeneity: ChiP = 1.17, df = 2 (P = 0.56), I ² = 0% Test for overall effect: Z = 1.63 (P = 0.10)								Total (95% CI)		3020		2110	100.0%	0.93 [0.83, 1.05]		Total events	580		395					Heterogeneity: ChiP = 2.89, df = 3 (P = 0.40), I ² = 0% Test for overall effect: Z = 1.17 (P = 0.24) Test for subgroup differences: ChiP = 1.81, df = 1 (P = 0.18), I ² = 44.7%							
Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total Events	Conventional Events	Total Events	Total Weight	Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI	Risk Ratio M-H,Fixed,95% CI																																																																																																																														
1.1 5 years																																																																																																																																					
Owen 2006a	163	535	77	271	21.9%	1.07 [0.85, 1.35]																																																																																																																															
Subtotal (95% CI)		535		271	21.9%	1.07 [0.85, 1.35]																																																																																																																															
Total events	163		77																																																																																																																																		
Heterogeneity: Not applicable Test for overall effect: Z = 0.80 (P = 0.55)																																																																																																																																					
1.2 10 years																																																																																																																																					
START_A 2008	260	1244	142	616	40.5%	0.91 [0.76, 1.09]																																																																																																																															
START_B 2008	129	1008	153	1003	32.7%	0.84 [0.66, 1.04]																																																																																																																															
Whelan 2002b	28	235	33	220	5.1%	1.14 [0.66, 1.93]																																																																																																																															
Subtotal (95% CI)		2485		1839	78.2%	0.89 [0.78, 1.02]																																																																																																																															
Total events	417		318																																																																																																																																		
Heterogeneity: ChiP = 1.17, df = 2 (P = 0.56), I ² = 0% Test for overall effect: Z = 1.63 (P = 0.10)																																																																																																																																					
Total (95% CI)		3020		2110	100.0%	0.93 [0.83, 1.05]																																																																																																																															
Total events	580		395																																																																																																																																		
Heterogeneity: ChiP = 2.89, df = 3 (P = 0.40), I ² = 0% Test for overall effect: Z = 1.17 (P = 0.24) Test for subgroup differences: ChiP = 1.81, df = 1 (P = 0.18), I ² = 44.7%																																																																																																																																					
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																																																																																																				
その他の解析	メタリグレッション 感度分析				コメント:																																																																																																																																

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																								
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																							
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(毛細管拡張)																																																																							
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	Shaitelman 2015 START_A 2008 START_B 2008																																																																					
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																							
効果指標	リスク比	統合値	0.68 (0.52 - 0.91) P= 0.009																																																																							
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shaitelman 2015</td> <td>0</td> <td>129</td> <td>1</td> <td>142</td> <td>1.3%</td> <td>0.37</td> <td>[0.02, 8.92]</td> </tr> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>61</td> <td>1456</td> <td>42</td> <td>730</td> <td>51.0%</td> <td>0.73</td> <td>[0.50, 1.07]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>34</td> <td>1094</td> <td>52</td> <td>1081</td> <td>47.7%</td> <td>0.65</td> <td>[0.42, 0.99]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>2679</td> <td></td> <td>1953</td> <td>100.0%</td> <td>0.68</td> <td>[0.52, 0.91]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>95</td> <td></td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 0.32, df = 2 (P = 0.85); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 2.63 (P = 0.009)</td> </tr> </tbody> </table> <p>コメント:</p>				Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	Shaitelman 2015	0	129	1	142	1.3%	0.37	[0.02, 8.92]	START_A 2008	61	1456	42	730	51.0%	0.73	[0.50, 1.07]	START_B 2008	34	1094	52	1081	47.7%	0.65	[0.42, 0.99]	Total (95% CI)		2679		1953	100.0%	0.68	[0.52, 0.91]	Total events	95		95					Heterogeneity: Chi ² = 0.32, df = 2 (P = 0.85); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 2.63 (P = 0.009)							
Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																			
	Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI		M-H, Fixed, 95% CI																																																																			
Shaitelman 2015	0	129	1	142	1.3%	0.37	[0.02, 8.92]																																																																			
START_A 2008	61	1456	42	730	51.0%	0.73	[0.50, 1.07]																																																																			
START_B 2008	34	1094	52	1081	47.7%	0.65	[0.42, 0.99]																																																																			
Total (95% CI)		2679		1953	100.0%	0.68	[0.52, 0.91]																																																																			
Total events	95		95																																																																							
Heterogeneity: Chi ² = 0.32, df = 2 (P = 0.85); I ² = 0%																																																																										
Test for overall effect: Z = 2.63 (P = 0.009)																																																																										
Funnel plot	<p>コメント:</p>																																																																									
その他の解析				コメント:																																																																						
メタリグレッション																																																																										
感度分析																																																																										



【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																									
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																								
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(乳房浮腫)																																																																								
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード	Shaitelman 2015 START_A 2008 START_B 2008																																																																						
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																								
効果指標	リスク比	統合値	0.63 (0.51 - 0.78) P< 0.0001																																																																								
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shaitelman 2015</td> <td>2</td> <td>129</td> <td>7</td> <td>142</td> <td>3.4%</td> <td>0.31</td> <td>[0.07, 1.49]</td> </tr> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>110</td> <td>1244</td> <td>78</td> <td>616</td> <td>52.9%</td> <td>0.70</td> <td>[0.53, 0.92]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>49</td> <td>1006</td> <td>86</td> <td>1003</td> <td>43.7%</td> <td>0.57</td> <td>[0.40, 0.80]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>2379</td> <td></td> <td>1761</td> <td>100.0%</td> <td>0.63</td> <td>[0.51, 0.78]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total events</td> <td>161</td> <td colspan="2">171</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 1.67, df = 2 (P = 0.43); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 4.31 (P < 0.0001)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	Shaitelman 2015	2	129	7	142	3.4%	0.31	[0.07, 1.49]	START_A 2008	110	1244	78	616	52.9%	0.70	[0.53, 0.92]	START_B 2008	49	1006	86	1003	43.7%	0.57	[0.40, 0.80]	Total (95% CI)		2379		1761	100.0%	0.63	[0.51, 0.78]	Total events		161	171					Heterogeneity: Chi ² = 1.67, df = 2 (P = 0.43); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 4.31 (P < 0.0001)							
	Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																																			
Events		Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																																					
Shaitelman 2015	2	129	7	142	3.4%	0.31	[0.07, 1.49]																																																																				
START_A 2008	110	1244	78	616	52.9%	0.70	[0.53, 0.92]																																																																				
START_B 2008	49	1006	86	1003	43.7%	0.57	[0.40, 0.80]																																																																				
Total (95% CI)		2379		1761	100.0%	0.63	[0.51, 0.78]																																																																				
Total events		161	171																																																																								
Heterogeneity: Chi ² = 1.67, df = 2 (P = 0.43); I ² = 0%																																																																											
Test for overall effect: Z = 4.31 (P < 0.0001)																																																																											
コメント:																																																																											
Funnel plot																																																																											
	コメント:																																																																										
その他の解析					コメント:																																																																						
メタリグレッション																																																																											
感度分析																																																																											

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																	
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(乳房萎縮)																																																																
研究デザイン	RCT	文献数	2	コード	START_A 2008 START_B 2008																																																														
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																
効果指標	リスク比	統合値	0.89 (0.79 - 1.00) P= 0.04																																																																
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>308</td> <td>1244</td> <td>165</td> <td>616</td> <td>46.3%</td> <td>0.92</td> <td>[0.79, 1.09]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>221</td> <td>1006</td> <td>256</td> <td>1003</td> <td>53.7%</td> <td>0.86</td> <td>[0.74, 1.01]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>2250</td> <td></td> <td>1619</td> <td>100.0%</td> <td>0.89</td> <td>[0.79, 1.00]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td colspan="2">529</td> <td colspan="2">421</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 0.38, df = 1 (P = 0.54); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 2.02 (P = 0.04)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	START_A 2008	308	1244	165	616	46.3%	0.92	[0.79, 1.09]	START_B 2008	221	1006	256	1003	53.7%	0.86	[0.74, 1.01]	Total (95% CI)		2250		1619	100.0%	0.89	[0.79, 1.00]	Total events	529		421					Heterogeneity: Chi ² = 0.38, df = 1 (P = 0.54); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 2.02 (P = 0.04)							
	Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																											
Events		Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																													
START_A 2008	308	1244	165	616	46.3%	0.92	[0.79, 1.09]																																																												
START_B 2008	221	1006	256	1003	53.7%	0.86	[0.74, 1.01]																																																												
Total (95% CI)		2250		1619	100.0%	0.89	[0.79, 1.00]																																																												
Total events	529		421																																																																
Heterogeneity: Chi ² = 0.38, df = 1 (P = 0.54); I ² = 0%																																																																			
Test for overall effect: Z = 2.02 (P = 0.04)																																																																			
<p>コメント:</p>																																																																			
Funnel plot																																																																			
	<p>コメント:</p>																																																																		
その他の解析					コメント:																																																														
メタリグレッション																																																																			
感度分析																																																																			

【4-9 メタアナリシス】

CQ	全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																											
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割(全乳房)																																																									
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(肋骨骨折)																																																									
研究デザイン	RCT	文献数	3	コード START_A 2008 START_B 2008 Whelan 2002b																																																								
モデル	固定効果		方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																								
効果指標	リスク比		統合値	0.87 (0.25 - 3.10) P= 0.83																																																								
Forest plot	<table border="1" data-bbox="466 742 1056 946"> <thead> <tr> <th>Study or Subgroup</th> <th>Hypofractionation Events</th> <th>Total</th> <th>Conventional Events</th> <th>Total</th> <th>Weight</th> <th>Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>1</td> <td>1487</td> <td>0</td> <td>749</td> <td>12.9%</td> <td>1.51 [0.06, 37.07]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>3</td> <td>1105</td> <td>3</td> <td>1110</td> <td>57.9%</td> <td>1.00 [0.20, 4.97]</td> </tr> <tr> <td>Whelan 2002b</td> <td>0</td> <td>622</td> <td>1</td> <td>612</td> <td>29.2%</td> <td>0.33 [0.01, 8.04]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>3214</td> <td></td> <td>2471</td> <td>100.0%</td> <td>0.87 [0.25, 3.10]</td> </tr> <tr> <td>Total events</td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Heterogeneity: Chi² = 0.50, df = 2 (P = 0.78); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Test for overall effect: Z = 0.21 (P = 0.83)</td> </tr> </tbody> </table>  <p data-bbox="466 946 1056 1019">コメント:</p>				Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total	Conventional Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI	START_A 2008	1	1487	0	749	12.9%	1.51 [0.06, 37.07]	START_B 2008	3	1105	3	1110	57.9%	1.00 [0.20, 4.97]	Whelan 2002b	0	622	1	612	29.2%	0.33 [0.01, 8.04]	Total (95% CI)		3214		2471	100.0%	0.87 [0.25, 3.10]	Total events	4		4				Heterogeneity: Chi ² = 0.50, df = 2 (P = 0.78); I ² = 0%							Test for overall effect: Z = 0.21 (P = 0.83)						
Study or Subgroup	Hypofractionation Events	Total	Conventional Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Fixed, 95% CI																																																						
START_A 2008	1	1487	0	749	12.9%	1.51 [0.06, 37.07]																																																						
START_B 2008	3	1105	3	1110	57.9%	1.00 [0.20, 4.97]																																																						
Whelan 2002b	0	622	1	612	29.2%	0.33 [0.01, 8.04]																																																						
Total (95% CI)		3214		2471	100.0%	0.87 [0.25, 3.10]																																																						
Total events	4		4																																																									
Heterogeneity: Chi ² = 0.50, df = 2 (P = 0.78); I ² = 0%																																																												
Test for overall effect: Z = 0.21 (P = 0.83)																																																												
Funnel plot	 <p data-bbox="466 1295 1056 1383">コメント:</p>																																																											
その他の解析	メタリグレーション 感度分析			コメント:																																																								

【4-9 メタアナリシス】

CQ		全乳房照射において通常分割照射と同等の治療として寡分割照射は勧められるか																																																																	
P	女性早期乳癌で温存手術後	I	寡分割照射(全乳房)																																																																
C	通常分割(全乳房)	O	⑦晩期(虚血性心疾患)																																																																
研究デザイン	RCT	文献数	2	コード	START_A 2008, START_B 2008の長期データは Haviland 2013より抽出																																																														
モデル	固定効果	方法	Mantel-Haenszel (RevMan5.3)																																																																
効果指標	リスク比	統合値	0.71 (0.28 - 1.79) P= 0.47																																																																
Forest plot	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Study or Subgroup</th> <th colspan="2">Hypofractionation</th> <th colspan="2">Conventional</th> <th rowspan="2">Weight</th> <th colspan="2">Risk Ratio</th> </tr> <tr> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>Events</th> <th>Total</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> <th>M-H, Fixed, 95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>START_A 2008</td> <td>5</td> <td>1487</td> <td>4</td> <td>749</td> <td>51.5%</td> <td>0.63</td> <td>[0.17, 2.34]</td> </tr> <tr> <td>START_B 2008</td> <td>4</td> <td>1110</td> <td>5</td> <td>1105</td> <td>48.5%</td> <td>0.80</td> <td>[0.21, 2.96]</td> </tr> <tr> <td>Total (95% CI)</td> <td></td> <td>2597</td> <td></td> <td>1854</td> <td>100.0%</td> <td>0.71</td> <td>[0.28, 1.79]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total events</td> <td>9</td> <td colspan="2">9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Heterogeneity: Chi² = 0.06, df = 1 (P = 0.80); I² = 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Test for overall effect: Z = 0.72 (P = 0.47)</td> </tr> </tbody> </table>					Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional		Weight	Risk Ratio		Events	Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI	START_A 2008	5	1487	4	749	51.5%	0.63	[0.17, 2.34]	START_B 2008	4	1110	5	1105	48.5%	0.80	[0.21, 2.96]	Total (95% CI)		2597		1854	100.0%	0.71	[0.28, 1.79]	Total events		9	9					Heterogeneity: Chi ² = 0.06, df = 1 (P = 0.80); I ² = 0%								Test for overall effect: Z = 0.72 (P = 0.47)							
	Study or Subgroup	Hypofractionation		Conventional			Weight	Risk Ratio																																																											
Events		Total	Events	Total	M-H, Fixed, 95% CI	M-H, Fixed, 95% CI																																																													
START_A 2008	5	1487	4	749	51.5%	0.63	[0.17, 2.34]																																																												
START_B 2008	4	1110	5	1105	48.5%	0.80	[0.21, 2.96]																																																												
Total (95% CI)		2597		1854	100.0%	0.71	[0.28, 1.79]																																																												
Total events		9	9																																																																
Heterogeneity: Chi ² = 0.06, df = 1 (P = 0.80); I ² = 0%																																																																			
Test for overall effect: Z = 0.72 (P = 0.47)																																																																			
コメント:																																																																			
Funnel plot																																																																			
	コメント:																																																																		
その他の解析																																																																			
メタリグレッション																																																																			
感度分析																																																																			