【4-7　評価シート　エビデンス総体】

診療ガイドライン	乳房手術後に腋窩リンパ節転移陽性の患者で、領域リンパ節照射あるいはPMRTを行う患者に対して、内胸リンパ節領域を含めることが勧められるか？
対象	腋窩リンパ節転移陽性の患者
介入	内胸リンパ節照射を行う
対照	内胸リンパ節照射を行わない

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
局所・領域リンパ節再発率の低下	コホート/1	-1	0	0	0	0		1597	39	2.4	1492	37	2.5	RR	1.02	0.65-1.58	弱(C)	8	
遠隔再発率の低下	コホート/1	-1	0	0	0	0		1597	478	29.7	1492	417	23.4	HR	0.89	0.78-1.01	弱(C)	7	
全生存率の改善	コホート/1	-1	0	0	0	0		1597	483	72.2	1492	385	75.9	HR	0.82	0.72-0.94	弱(C)	9	
晩期有害事象(心毒性)	コホート/1	-1	0	0	-1	0		1597	9	0.6	1492	9	0.6	RR	1.07	0.43-2.69	非常に弱(D)	7	

コメント(該当するセルに記入)

															自分で計算			
															自分で計算			