【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	再発リスクの低いStage I･II乳癌術後の定期的な全身画像検査は推奨されるか？
対象	Stage Ⅰ・Ⅱ乳癌の術後患者
介入	術後、定期的な画像検査を施行する
対照	術後、定期的な画像検査を施行しない

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

								リスク人数(アウトカム率)											
アウトカム	**研究デザイン/研究数**	**バイアスリスク***	**非一貫性***	**不精確***	**非直接性***	**その他(出版バイアスなど)***	**上昇要因(観察研究)***	**対照群分母**	**対照群分子**	**(%)**	**介入群分母**	**介入群分子**	**(%)**	**効果指標(種類)**	**効果指標統合値**	**信頼区間**	**エビデンスの強さ****	**重要性*****	**コメント**
全生存期間の改善	RCT/2	0	0	0	0	0		1286	243	19%	1277	248	19%				強(A)	9	StageI-III乳癌術後フォローアップにおいて、通常のフォローアップ群とインテンシブフォローアップ群を比較した2つの前向研究では全生存期間は改善しないことが示されている。
医療費の増加	その他/1							NA	NA	NA	NA	NA	NA				非常に弱(D)	8	医療費の増加における通常のフォローアップ群とインテンシブフォローアップ群とを比較した研究が我が国より1件報告されていた。
被曝の増加								NA	NA	NA	NA	NA	NA					7	被曝の増加において通常のフォローアップ群とインテンシブフォローアップ群の比較に関する研究報告は認められなかった。
偶発性病変の検出								NA	NA	NA	NA	NA	NA					6	偶発性病変の検出において通常のフォローアップ群とインテンシブフォローアップ群の比較に関する研究報告は認められなかった。

コメント(該当するセルに記入)