【4-7 評価シート エビデンス総体】

診療ガイドライン	CQ19:HER2陰性転移再発乳癌に対する化学療法は単剤か併用かどちらが推奨されるか？
対象	HER2陰性転移再発乳癌患者
介入	併用
対照	単剤

エビデンスの強さはRCTは"強(A)"からスタート、観察研究は弱(C)からスタート
* 各ドメインは"高(-2)"、"中/疑い(-1)"、"低(0)"の3段階
** エビデンスの強さは"強(A)"、"中(B)"、"弱(C)"、"非常に弱(D)"の4段階
*** 重要性はアウトカムの重要性(1～9)

エビデンス総体

アウトカム	研究デザイン/研究数	バイアスリスク*	非一貫性*	不精確*	非直接性*	その他(出版バイアスなど)*	上昇要因(観察研究)*	リスク人数(アウトカム率) 対照群分母	対照群分子	(%)	介入群分母	介入群分子	(%)	効果指標(種類)	効果指標統合値	信頼区間	エビデンスの強さ**	重要性***	コメント
Overall survival	RCT/33	-1	0	0	-2	0		4515	-	-	4190	-	-	Hazard ratio	0.89	0.84-0.94	弱(C)	9	
Progression free survival	RCT/27	-1	-1	0	-2	0		4091	-	-	3968	-	-	Hazard ratio	0.8	0.74-0.86	弱(C)	7	
Overall response rate	RCT/46	-1	-1	0	-2	-1		5316	1636	30.8	5220	2095	40.1	Risk ratio	1.28	1.15-1.42	弱(C)	7	
Quality of life	RCT/13																	7	各試験によるQOLの評価項目が異なるため、メタアナリシス、定量的SRは困難
Toxicity																		7	以下の4項目で評価した
Toxicity; Nausea and vomitting	RCT/33	-1	-2	0	-2	0		4819	525	10.9	4426	546	12.3	Risk ratio	1.18	0.89-1.56	弱(C)		
Toxicity; White cell count	RCT/36	-1	-2	0	-2	0		4964	1571	31.6	4673	2322	49.7	Risk ratio	1.69	1.36-2.11	弱(C)		
Toxicity; Alopecia	RCT/24	-1	-2	0	-2	-1		3469	954	27.5	3468	1300	37.5	Risk ratio	1.15	0.91-1.47	弱(C)		
Toxicity; treatment related death	RCT/27	-1	0	-1	-1	0		3947	60	1.52	3661	57	1.56	Risk ratio	1.11	0.74-1.66	中(B)		
Cost																		6	アウトカムを記載した文献無し

コメント(該当するセルに記入)